

Chapter 6 Series Solutions of Linear Equations

當 DE 為 linear 且 coefficients 為 polynomials

→ 假設 DE 的 solutions 為 polynomial 的型態

(和 Cauchy-Euler Method 以及 Taylor Series 的概念相近)


$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$$
 series solutions

被稱作為 power series centered at x_0

Power series 觀念的複習 (Sec. 6-1)

解法

x_0 is a non-singular point (Sec. 6-2)

Examples (Sec. 6-4) 只教不考

x_0 is a singular point

regular singular point
(Sec. 6-3)

irregular singular point
(cannot be solved
by series solutions)

Section 6-1 Reviews of Power Series

6-1-1 定義

1. Power series

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n = c_0 + c_1 (x - x_0) + c_2 (x - x_0)^2 + \dots$$

2. Convergence: $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N c_n (x - x_0)^n$ exists
★1,

測試方法：Ratio test (test for convergence)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1} (x - x_0)^{n+1}}{c_n (x - x_0)^n} \right| = L \quad \begin{array}{ll} L < 1: \text{converge} & L > 1: \text{diverge} \\ L = 1: \text{不一定} & \end{array}$$

★2

(ROC)

3. Radius of Convergence R

$$L < 1 \text{ if } |x - x_0| < R \quad L > 1 \text{ if } |x - x_0| > R$$

Example 1 (text page 238)

For the Power series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^n n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(x-3)^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)}}{\frac{(x-3)^n}{2^n n}} \right| = |x-3| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)} = \frac{|x-3|}{2}$$

$-2 < x-3 < 2$

$$\frac{|x-3|}{2} < 1 \quad \text{for } 1 < x < 5$$

Interval of convergence: (1, 5)

However, since when $x = 1$, the power series becomes

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n / n, \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \dots$$

convergent

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} = 1$$

$$x_0 = 3, R = 2$$

$\text{if } x < 1 \text{ or } x > 5$
 $\Rightarrow \frac{|x-3|}{2} > 1$
diverge

which is also convergent, the interval of convergence is modified as:

If $x = 5$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$
diverge

Interval of convergence: [1, 5)

$$1 \leq x < 5$$

6-1-2 Maclaurin Series (Taylor Series)

$$\begin{aligned}y(x) &= y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{y'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \\&\quad + \frac{y^{(4)}(x_0)}{4!}(x - x_0)^4 + \dots\end{aligned}$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

*3

#4

Maclaurin Series (Taylor Series)	Interval of Convergence
$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	(-∞, ∞)
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	(-∞, ∞)
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots$	(-∞, ∞)
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$	(-1, 1]
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ first term = 1, ratio = x	(-1, 1)

$$e^{2x} = ?$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}$$

$$\cos 3x = ?$$

$$\frac{a_0}{1-r}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln(1+x) &= \frac{1}{1+x} \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \\ \ln(1+x) &= \int (1 - x + x^2 - x^3 + \dots) dx \end{aligned}$$

Example 2 (text page 240)

Find a power series representation of $e^x \sin x - \frac{1}{6}x^3$

\star_5

$$\begin{aligned}
 e^x \sin x &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots \right) \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots \right) \\
 &= (1)x + (1)\underline{x^2} + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right)x^3 + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)x^4 + \left(\frac{1}{120} - \frac{1}{12} + \frac{1}{24} \right)x^5 + \dots \\
 &= x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots
 \end{aligned}$$

Section 6-2 Solutions about Ordinary Points

278

Suppose that the solution is $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ ~~☆☆~~

6-2-1 方法適用情形



(1) Linear

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

(2) x_0 is not a singular point

$$y^{(n)} + \frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)} y^{(n-1)} + \dots + \frac{a_1(x)}{a_n(x)} y' + \frac{a_0(x)}{a_n(x)} y = \frac{g(x)}{a_n(x)}$$

(3) It is better that $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x), g(x)$ are all polynomials.

(or can be expressed by Taylor series)

6-2-2 解法流程 ★★

Step 1 將 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ 代入 (x_0 必需為 ordinary point)

For simplification, we usually set $x_0 = 0$ if
0 is not a singular point.

不是 singular point 的
即為 ordinary point

Step 2 對齊 (一律變成 $(x - x_0)^k$)

Step 3 合併

Step 4 比較係數，將 c_n 之間的關係找出來

Step 5 Obtained independent solutions and general solution

6-2-3 例子

Example 5 (text page 246)

$$y'' - xy = 0$$

Set $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

(choose $x_0 = 0$) since $P(x) = 0$ and $Q(x) = x$ are analytic at 0

*no singular point
 $\therefore R \rightarrow \infty$ (from page 293)
convergence interval
 $|x-x_0| < R$, \therefore the solution
is convergent for any x*

Step 1 $y'' + xy = \sum_{n=2}^{\infty} c_n n(n-1)x^{n-2} - x \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$

Note! \star_2 $n=2$

$$\sum_{n=2}^{\infty} c_n n(n-1)x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1} = 0$$

 \star_3 set $k = n - 2$ $n = k+2$

Step 2 對齊 $\sum_{k=0}^{\infty} c_{k+2} (k+2)(k+1)x^k - \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^k = 0$

Note! \star_2

set $k = n + 1$ $n = k-1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_{k+2} (k+2)(k+1)x^k - \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^k = 0$$

\star_4

$k=0$ $k \geq 1$

Step 3 $2c_2 + \sum_{k=1}^{\infty} [c_{k+2}(k+2)(k+1) - c_{k-1}]x^k = 0$

Step 4 $2c_2 = 0$ $c_{k+2}(k+2)(k+1) - c_{k-1} = 0$

\star_5 $c_2 = 0$ 或 $c_{k+2} = \frac{c_{k-1}}{(k+2)(k+1)}$ $k=1, 2, 3, \dots$

recurrence relation

c_0, c_1 紿定之後

$$k=1 \quad c_3 = \frac{c_0}{2 \cdot 3}$$

$$k=2 \quad c_4 = \frac{c_1}{3 \cdot 4}$$

$$k=3 \quad c_5 = \frac{c_2}{4 \cdot 5} = 0$$

以此類推，所有的 c_n 的值都可以算出來（以 c_0 或 c_1 表示）

$$c_{k+2} = \frac{c_{k-1}}{(k+2)(k+1)}$$

$$k=4 \quad c_6 = \frac{c_3}{5 \cdot 6} = \frac{c_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6}$$

$$k=5 \quad c_7 = \frac{c_4}{6 \cdot 7} = \frac{c_1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}$$

$$k=6 \quad c_8 = \frac{c_5}{7 \cdot 8} = 0$$

$$k=7 \quad c_9 = \frac{c_6}{8 \cdot 9} = \frac{c_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$k=8 \quad c_{10} = \frac{c_7}{9 \cdot 10} = \frac{c_1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 10}$$

$$k=9 \quad c_{11} = \frac{c_8}{10 \cdot 11} = 0$$

:

:

$$c_{3k} = \frac{c_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdots (3k-1) \cdot (3k)}$$

group 1 $c_0, c_3, c_6, c_9 \dots$

group 2 $c_1, c_4, c_7, c_{10} \dots$

group 3 $c_2, c_5, c_8, c_{11} \dots$

$$c_{3k+1} = \frac{c_1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdots 3k(3k+1)}$$

$$c_{3k+2} = 0$$

group1 group2 group3

Step 5 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{k=0}^{\infty} c_{3k} x^{3k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{3k+1} x^{3k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{3k+2} x^{3k+2}$

$$= c_0 \left[1 + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^6}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{x^9}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} + \dots \right] \quad y_1$$

$$+ c_1 \left[x + \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^7}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{x^{10}}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 10} + \dots \right] \quad y_2$$
 $y(x) = c_0 y_1(x) + c_1 y_2(x)$

1 is not the special case of k=0


★6 $y_1(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2 \cdot 3 \cdots (3k-1)(3k)} x^{3k}$

不寫在 Σ 裡面 $y_2(x) = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 4 \cdots (3k)(3k+1)} x^{3k+1}$ *x is not the special case of k=0*

ratio test:
for y_1 , $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)^{\text{th term}}}{k^{\text{th term}}} \right|$ $\therefore y_1$ is convergent for every x

★7 $= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x^3}{(3k+2)(3k)} \right|$
 $= 0 \text{ for any } x$

for y_2 $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x^3}{(3k+3)(3k+4)} \right| = 0$ for any x
 $\therefore y_2$ is convergent for every x .

Example 6 (text page 248) 

$$(x^2 + 1)y'' + xy' - y = 0 \quad y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad (\text{analytic at } x = 0)$$

Radius of convergence?

standard $y'' + \frac{x}{x^2+1}y' - \frac{1}{x^2+1}y = 0$ *x_0 is a singular point*

Step 1 $\star_2 \quad \left(x^2 + 1 \right) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} nc_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} nc_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

Step 2 $\star_3 \quad \begin{array}{c} \downarrow k=n \\ \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} kc_k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0 \end{array}$

\star_2

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2}x^k + \sum_{k=1}^{\infty} kc_k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

Step 3

$$\frac{2c_2 - c_0}{k=0} + \frac{(6c_3 + c_1 - c_1)x}{k=1}$$

~~Step 4~~

$$+ \sum_{k=2}^{\infty} [k(k-1)c_k + (k+2)(k+1)c_{k+2} + kc_k - c_k] x^k = 0$$

$$2c_2 - c_0 + 6c_3 x + \sum_{k=2}^{\infty} [(k+1)(k-1)c_k + (k+2)(k+1)c_{k+2}] x^k = 0$$

Step 4

$$2c_2 - c_0 = 0$$

$$6c_3 = 0$$

$$c_{k+2} = -\frac{k-1}{k+2} c_k$$

\star_3

$$2c_2 - c_0 = 0$$

$$c_2 = c_0/2$$

$$6c_3 = 0$$

$$c_3 = 0$$

$$c_{k+2} = \frac{1-k}{k+2} c_k$$

$\leftarrow k=2 \sim \infty$

c_0, c_1 細定之後

$$c_2 = c_0/2$$

$$k=5 \quad c_7 = -\frac{4}{7} c_5 = 0$$

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \\ & = 2^4 (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4) = 2^4 4! \end{aligned}$$

$$c_3 = 0$$

$$k=6 \quad c_8 = -\frac{5}{8} c_6 = -\frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} c_0 = -\frac{3 \cdot 5}{2^4 \cdot 4!} c_0$$

$$k=2 \quad c_4 = -\frac{1}{4} c_2 = -\frac{1}{2 \cdot 4} c_0 = -\frac{1}{2^2 \cdot 2!} c_0$$

$$k=7 \quad c_9 = -\frac{6}{9} c_7 = 0$$

$$k=3 \quad c_5 = -\frac{2}{5} c_3 = 0$$

:

$$k=4 \quad c_6 = -\frac{3}{6} c_4 = \frac{3}{2 \cdot 4 \cdot 6} c_0 = \frac{3}{2^3 \cdot 3!} c_0$$

:

group 1

c_0, c_2, c_4, \dots

$$c_{2k} = \frac{(-1)^{k-1} 3 \cdot 5 \cdots (2k-3)}{2^k k!} c_0$$

group 2

c_1, c_3, c_5, \dots

c_1 is free to choose

$c_{2k+1} = 0$ for $k \geq 1$

Step 5 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k} x^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k+1} x^{2k+1}$

group 1 **group 2**

$$= c_0 \left[1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2^2 \cdot 2!} + \frac{3x^6}{2^3 \cdot 3!} - \frac{3 \cdot 5 x^8}{2^4 \cdot 4!} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 x^{10}}{2^5 \cdot 5!} \dots \dots \right] + c_1 x$$

$$y(x) = c_0 \frac{y_1(x) + c_1 y_2(x)}{y_1} \quad y_2$$

#6 不寫在 Σ 裡面
 $1, \frac{1}{2}x^2$ are not the special cases of $n=0, 1$

$$y_1(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^n n!} x^{2n} \quad |x| < 1 \text{ (Why?)}$$

$$y_2(x) = x$$

ratio test: for y_1

y_2 is convergent (since there is only one term)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^{\text{th term}}}{n^{\text{th term}}} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n-1)x^2}{2(n+1)} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n-1}{2n+2} x^2 \right| = |x^2|$$

#7 When $|x| < 1$, ratio $= |x^2| < 1$ convergent

Example 8 (text page 250)

#8

$$y'' + (\cos x)y = 0$$

Taylor series

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots \dots \dots$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

$$= c_0 + c_1 x + 2c_2 x^2 + 6c_3 x^3 + 12c_4 x^4 + 20c_5 x^5 + \dots \dots$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} c_n n(n-1)x^{n-2} + \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots \dots \dots\right) \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

$$c_0 + c_1 x + (c_2 - \frac{c_0}{2})x^2 + (c_3 - \frac{c_1}{2})x^3 + \dots \dots$$

直接乘開來比較係數

$$2c_2 + c_0 + (6c_3 + c_1)x + \left(12c_4 + c_2 - \frac{c_0}{2}\right)x^2 + \left(20c_5 + c_3 - \frac{c_1}{2}\right)x^3 + \dots \dots = 0$$

no singular point
 \therefore solutions are convergent
 for any x

$$2c_2 + c_0 + (6c_3 + c_1)x + \left(12c_4 + c_2 - \frac{c_0}{2}\right)x^2 + \left(20c_5 + c_3 - \frac{c_1}{2}\right)x^3 + \dots = 0$$

$$2c_2 + c_0 = 0 \Rightarrow c_2 = -c_0 / 2$$

$$6c_3 + c_1 = 0 \Rightarrow c_3 = -c_1 / 6$$

$$12c_4 + c_2 - c_0 / 2 = 0 \Rightarrow 12c_4 - c_0 = 0 \Rightarrow c_4 = c_0 / 12$$

$$20c_5 + c_3 - c_1 / 2 = 0 \Rightarrow 20c_5 - 2c_1 / 3 = 0 \Rightarrow c_5 = c_1 / 30$$

:

:

$$y_1(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12}x^4 - \dots \quad y_2(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{30}x^5 - \dots$$

$$y(x) = c_0 y_1(x) + c_1 y_2(x)$$

6-2-4 定義

1. Analytic at x_0 : If a function can be expressed as a power series and the radius of convergence of the power series is nonzero

*9

簡單的判斷 $f(x)$ 在 x_0 是否為 analytic 方法

(1) $f(x_0)$ should be neither ∞ nor $-\infty$

(2) $f^{(m)}(x_0)$ should be neither ∞ nor $-\infty$

$$m = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{ex: If } f(x) = x^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$f'(0) \rightarrow \infty$$

$\therefore f(x)$ is not analytic at 0

x^a is not analytic at 0
if a is not an integer

2. Ordinary Point and Singular Point:

- For the 2nd order linear DE

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \xrightarrow[\text{form}]{\text{standard}} y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

Definition 6.2.1

名 .

$$P = \frac{a_1}{a_2}, \quad Q = \frac{a_0}{a_2}$$

★₁₀ x_0 is an **ordinary point** of the 2nd order linear DE if both $P(x)$ and $Q(x)$ are **analytic** at x_0

名₂

Otherwise, x_0 is a **singular point**.

Theorem 6.2.1

homogeneous

✓

★₁₁ If x_0 is an **ordinary point** of the 2nd order linear DE, then we can find **two linearly independent solutions** in the form of a power series centered at x_0 , i.e.,

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$$

- For the k^{th} order linear DE

$$a_k(x)y^{(k)} + a_{k-1}(x)y^{(k-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

$$\longrightarrow y^{(k)} + P_{k-1}(x)y^{(k-1)} + \dots + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0$$

$$P_m(x) = \frac{a_m(x)}{a_k(x)}$$

Extension of Definition 6.2.1

★₁₀ x_0 is an **ordinary point** of the k^{th} order linear DE if $P_0(x)$, $P_1(x)$, $P_2(x)$, ..., $P_{k-1}(x)$, are **analytic** at x_0

Otherwise, x_0 is a **singular point**.

Extension of Theorem 6.2.1

★₁₁ If x_0 is an **ordinary point** of the k^{th} order linear DE, then we can find **k linearly independent solutions** in the form of a power series centered at x_0 , i.e.,

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$$

6-2-5 Interval of Convergence 的判斷方法

ratio test

判斷方法一：找出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}(x - x_0)^{n+1}}{c_n(x - x_0)^n} \right| < 1$ 的條件

判斷方法二

(較快速，但較不精準

找出的收斂的範圍有時會比實際的收斂範圍小)

★₁₂ $|x - x_0| < R$

其中 R 是 x_0 和最近的 singular point 的距離

Singular point can be a complex number , see Example 6

超過這個範圍未必不為 convergence

6-2-6 思考

(1) 對於 nonhomogeneous 的情形.....

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = g(x)$$

(2) 這方法還可以用在什麼情形？

6-2-7 本節需注意的地方

- (1) 要了解幾個重要定義：(a) convergence, (b) radius of convergence,
(c) analytic at x_0 , (d) singular point, (e) ordinary point
- (2) 複習一下 Taylor (Maclaurin) series (如 page 276)
- (3) Index 的地方計算要小心
 - (a) 先都化成 x^k 再合併，(b) 頭幾項可能要獨立出來
 - (c) Index 對齊計算要小心
- (4) n^{th} order linear DE 要有 n 個 linearly independent 解
- (5) 有時要考慮 interval of convergence

Section 6-3 Solutions about Singular Points

$$y^{(n)} + P_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0 \quad (\text{standard form})$$

假設解為

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}$$

if x_0 is a singular point
 Sec 6-2 Sec 6-3
 $c_n(x - x_0)^n \rightarrow C_n(x - x_0)$

6-3-1 方法適用情形

(1) Linear

~~★, 限制~~

(2) $(x - x_0)P_{n-1}(x), (x - x_0)^2P_{n-2}(x), \dots, (x - x_0)^{n-1}P_1(x),$

$(x - x_0)^n P_0(x)$ are analytic at x_0

(比較 : Section 6-2 要求 $P_{n-1}(x), P_{n-2}(x), \dots,$

$P_1(x), P_0(x)$ are analytic at x_0)


(3) It is better that $P_0(x), P_1(x), \dots, P_{n-1}(x)$ are all polynomials.

6-3-2 定義

\star_2 Singular Points 分成二種

- If x_0 is a singular point but $(x - x_0)P_{n-1}(x), (x - x_0)^2P_{n-2}(x), \dots, (x - x_0)^{n-1}P_1(x)$,

$(x - x_0)^n P_0(x)$ are analytic at x_0



x_0 : regular singular point 名,

- If $(x - x_0)P_{n-1}(x), (x - x_0)^2P_{n-2}(x), \dots, (x - x_0)^{n-1}P_1(x)$,

$(x - x_0)^n P_0(x)$ are not analytic at x_0

x_0 : irregular singular point 名₂

Example 1 (text page 253)

$$(x^2 - 4)^2 y'' + 3(x-2)y' + 5y = 0$$

$$y'' + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0$$

$$P_1(x) = \frac{3}{(x-2)(x+2)^2} \quad P_0(x) = \frac{5}{(x-2)^2(x+2)^2}$$

singular points : $x = \pm 2$

$$(x-2)P_1 = \frac{3}{(x+2)^2} \quad (x+2)^2 P_0 = \frac{5}{(x-2)^2}$$

$x = 2$ is a *regular singular point*

$x = -2$ is a *irregular singular point*

$$(x+2)P_1 = \frac{3}{(x-2)(x+2)} \\ (x+2)^2 P_0 = \frac{5}{(x-2)^2}$$

6-3-3 解法

解法的關鍵：

假設解為 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}$

Theorem 6.3.1 Frobenius' Theorem

名₃



若 x_0 是 linear DE 當中的一個 regular singular point

則這個 linear DE 至少有一個解是 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}$ 的型態
注意

★★ → Section 6-3 解法
(Process of the Frobenius Method) 比較 page 279

300

Step 1 將 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^{n+r}$ 代入
 名字 不同 $n \rightarrow n+r$

Step 2 Power 對齊(以指數較小的為準)

Step 3 合併

Step 4 算出 r 不同 \exists

Step 5 比較係數，將 c_n 之間的關係找出來

Step 6 將 Step 4 得出的 r 代入 Step 5

$$y_1 = \underline{x^r} \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n$$

得出所有的 independent solutions 及 general solution

Step 7 (見後頁)

(Step 7) \star_{12} 不同五

當 (1) r 有重根

或 (2) r 的根之間的差為整數，且從 Step 6 得出來的解不為 independent 時

用 $y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx$ 和長除法找出 $y_2(x)$

(參考 Section 6-3 的 Examples 4, 5)

當 r 的根之間的差為整數，但從 Step 6 得出來的解為 independent 時，
不需進行這個步驟

6-3-4 範例

Example 2 (text page 255)

$$3xy'' + y' - y = 0$$

$$\text{standard } y'' + \frac{1}{3x}y' - \frac{1}{3x}y = 0$$

$x_0 = 0$ is a singular point
regular singular point

Step 1 將 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}$ 代入

$$\star_4 3 \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(n+r-1)x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r} = 0$$

不同二

Step 2 Power 對齊

$$\star_5 \text{ 以指數較小為準}$$

$n = k$

$$\star_5 \text{ note: if } n-1=k$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k (k+r)(k+r-1)x^{k+r-1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r)x^{k+r-1} - \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^{k+r-1} = 0$$


$\underline{n = k - 1}$
 $\underline{k = n + 1}$

Note!

$$3\sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r)(k+r-1)x^{k+r-1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r)x^{k+r-1} - \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^{k+r-1} = 0$$

Step 3 合併

\star_6



$$[3c_0r(r-1) + c_0r]x^{r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [3c_k(k+r)(k+r-1) + c_k(k+r) - c_{k-1}]x^{k+r-1} = 0$$

Step 4 算出 r

$$c_0(3r(r-1) + r) = 0 \quad \text{假設 } c_0 \neq 0$$

\star_7

$$3r(r-1) + r = 0 \quad 3r^2 - 2r = 0 \quad r(3r - 2) = 0$$

名₄ initial
equation

$$r = 0 \quad \text{or} \quad 2/3$$

Step 5

$$3c_k(k+r)(k+r-1) + c_k(k+r) - c_{k-1} = 0$$

$$c_k = \frac{1}{(k+r)(3k+3r-2)} c_{k-1}$$

Step 6

★8

$$c_k = \frac{1}{(k+r)(3k+3r-2)} c_{k-1}$$

當 $r=0$

$$c_k = \frac{c_{k-1}}{k(3k-2)}$$

$$k=1 \quad c_1 = \frac{c_0}{1 \cdot 1}$$

$$k=2 \quad c_2 = \frac{c_1}{2 \cdot 4} = \frac{c_0}{2!1 \cdot 4}$$

$$k=3 \quad c_3 = \frac{c_2}{3 \cdot 7} = \frac{c_0}{3!1 \cdot 4 \cdot 7}$$

$$k=4 \quad c_4 = \frac{c_3}{4 \cdot 10} = \frac{c_0}{4!1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10}$$

:

$$c_n = \frac{c_0}{n!1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)}$$

from k

from $3k-2$ 當 $r=2/3$

$$c_k = \frac{1}{(3k+2)k} c_{k-1}$$

$$k=1 \quad c_1 = \frac{c_0}{5 \cdot 1}$$

$$k=2 \quad c_2 = \frac{c_1}{8 \cdot 2} = \frac{c_0}{2!5 \cdot 8}$$

$$k=3 \quad c_3 = \frac{c_2}{11 \cdot 3} = \frac{c_0}{3!5 \cdot 8 \cdot 11}$$

$$k=4 \quad c_4 = \frac{c_3}{14 \cdot 4} = \frac{c_0}{4!5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14}$$

:

$$c_n = \frac{c_0}{n!5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}$$

from k

from $3k+2$

Solution of Example 2 (別忘了將最後的解寫出)

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r} = x^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

\star_9 $y_1(x) = \frac{x^0}{=} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)} x^n \right]$

for different r $\stackrel{r=0}{=} \quad \stackrel{r=2/3}{=}$ case for $n=0$, not a special case of summation

$y_2(x) = \frac{x^{2/3}}{=} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)} x^n \right]$

不同因乘 x^r \uparrow $n=0 \star_{10}$

\star_{10} $y_2: x^{\frac{2}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

Don't forget it!
(乘 x^r)

$x \in (0, \infty)$ ($x=0$ is singular) set $c_0=1$

(別忘了寫出 x 的範圍)

convergence: ratio test

for y_1 , $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^{\text{th term}}}{n^{\text{th term}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{(n+1)(3n+1)} \right| = 0$ for all x

y_2 , $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{(n+1)(3n+5)} \right| = 0$

$$P_0 = \frac{1}{x} \quad P_1 = 0 \quad 306$$

Examples 4, 5 (text pages 258, 259)

$$xy'' + y = 0 \quad \text{standard } y'' + \frac{y}{x} = 0 \quad x^2 P_0 = x, \quad x P_1 = 0$$

Step 1 將 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}$ 代入

$$\star_4 \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(n+r-1)x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r} = 0 \quad \therefore x_0 = 0 \text{ is a regular singular point (Frobenius method can be applied)}$$

Step 2 對齊

$$\star_5 \quad \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r)(k+r-1)x^{k+r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^{k+r-1} = 0$$

Step 3 合併

$$\star_6 \quad c_0 r(r-1)x^{r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k (k+r)(k+r-1) + c_{k-1}] x^{k+r-1} = 0$$

$$c_0 r(r-1)x^{r-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k(k+r)(k+r-1) + c_{k-1}]x^{k+r-1} = 0$$

Step 4 $\frac{r(r-1)=0}{r=0 \text{ or } 1}$ 假設 $c_0 \neq 0$

Step 5 $c_k = -\frac{c_{k-1}}{(k+r)(k+r-1)}$ $\leftarrow k \geq 1$

Step 6 \star_8 當 $r=1$ $c_k = -\frac{c_{k-1}}{(k+1)k}$

$c_n = (-1)^n \frac{c_0}{(n+1)!n!}$

$\frac{(-1)^n}{(n+1)!}:$ from -1
 $\frac{1}{n!}:$ from $k+1$, $k=1 \sim n$

\star_9 $y_1 = x^r \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)^n$

$y_1(x) = x \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+1)!} x^n \right] = x \left[\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+1)!} x^n}_{n=0} \right]$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+1)!} x^{n+1}$$

$0! = 1$

\star_{10} $n=0$ is a

special case
of the
summation

$y_1 = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{12} - \frac{x^4}{144} + \dots$

$$\frac{(-1)^0}{0! 1!} = 1$$

Step 6 當 $r=0$ $c_k = -\frac{c_{k-1}}{(k-1)k}$ $k \geq 1$ but $k=1$ has some³⁰⁸ problem

but $k=1$ 時不能算 \star_{11}

此時，應該根據 Step 3，由

$$c_k(k+r)(k+r-1) + c_{k-1} = c_1 \cdot 0 + c_0 = 0$$

($k=1, r=0$ 代入)

c_0 必需等於 0, c_1 可為任意值

$$\begin{aligned} k=2 & \quad c_2 = -\frac{c_1}{1 \cdot 2} & k=3 & \quad c_3 = -\frac{c_2}{2 \cdot 3} = \frac{c_1}{1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3} & \dots & \\ & c_n = \frac{(-1)^{n-1} c_1}{(n-1)! n!} & (-1)^{n-1} & \text{is from } -1 & \text{這地方容易犯錯,} \\ & & (n-1)! & \text{is from } k-1 & \text{要小心} \\ & & n! & \text{is from } k & \end{aligned}$$

$$y_2(x) = x^0 \left[x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)! n!} x^n \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)! n!} x^n = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+1)!} x^{m+1}$$

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1(x) \\ & x^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n & m = n-1 \\ & r=0, c_0=0 \\ & c_1=1 \end{aligned}$$

因為前頁算出來的 $y_2(x)$ 等於 $y_1(x)$ ，

只好另外用 Sec. 4-2 “reduction of order” 的方法求解

\star_{12} 不同五

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx$$

standard form y' 的係數
 $P = 0$

註：若算出的 $y_2(x)$ 等於 $y_1(x)$ 乘上一個 constant, 則 $y_2(x)$ 和 $y_1(x)$ 仍視同 linearly dependent, 仍需要用上方 “reduction of order” 的方法來求另外一個解

$$\begin{aligned}
 & P=0 \quad e^{-\int 0 dx} = e^{-c} = 1 \quad \text{set } c=0 \\
 y_2(x) &= y_1(x) \int \frac{e^{-\int 0 dx}}{y_1^2(x)} dx = y_1(x) \int \frac{dx}{[x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{144}x^4 + \dots]^2} \\
 &= y_1(x) \int \frac{dx}{[x^2 - x^3 + \frac{5}{12}x^4 - \frac{7}{72}x^5 + \dots]} \quad \xrightarrow{\text{long division}} \quad x \cdot \frac{1}{12}x^3 + (-\frac{1}{2}x^2)(-\frac{1}{2}x^4) + \frac{1}{12}x^3 \cdot x \\
 &= y_1(x) \int \left[\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{7}{12} + \frac{19}{72}x + \dots \right] dx \quad \text{長除法} \\
 &= y_1(x) \left[-\frac{1}{x} + \ln x + \frac{7}{12}x + \frac{19}{144}x^2 + \dots \right] \quad \text{思考：為何不是 } \ln|x|? \\
 &= y_1(x) \ln x + y_1(x) \left[-\frac{1}{x} + \frac{7}{12}x + \frac{19}{144}x^2 + \dots \right] \\
 &= y_1(x) \ln x + \left[-1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + \dots \right]
 \end{aligned}$$

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

6-3-5 多項式的長除法

計算 $\frac{1}{x^2 - x^3 + \frac{5}{12}x^4 - \frac{7}{72}x^5 + \dots}$ $= 1 \cdot x^{-2} + 1 \cdot x^{-1} + \frac{7}{12} \cdot 1 + \frac{19}{72} \cdot x + \dots$

☆₁₃

$$\begin{array}{cccccc}
 & (x^{-2}) & (x^{-1}) & (1) & (x) & \\
 & 1 & 1 & \frac{7}{12} & \frac{19}{72} & \dots \\
 \hline
 1 & -1 & \frac{5}{12} & -\frac{7}{72} & \dots & \sqrt{1 \quad 0 \quad 0 \quad 0} \\
 (x^2) & (x^3) & (x^4) & (x^5) & & \\
 & (1) & (x) & (x^2) & (x^3) & \\
 & 1 & -\frac{5}{12} & \frac{7}{72} & \dots & \\
 \hline
 & 1 & -1 & \frac{5}{12} & -\frac{7}{72} & \dots \\
 & x^2 & x^3 & & & \\
 \hline
 & \frac{7}{12} & -\frac{23}{72} & \dots & \dots & \\
 & \frac{7}{12} & -\frac{7}{12} & \frac{35}{144} & -\frac{49}{864} & \dots \\
 \hline
 & & x^3 & & & \\
 & & \frac{19}{72} & \dots & &
 \end{array}$$

指示

6-3-6 Indicial Equation

查此字

2nd order case $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

If x_0 is a regular singular point



$$(x - x_0)^2 y'' + (x - x_0) p(x) y' + q(x) y = 0$$

$$\text{where } p(x) = (x - x_0)P(x) \quad q(x) = (x - x_0)^2 Q(x)$$

由於 $p(x)$ 和 $q(x)$ 皆為 analytic

$$p(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots$$

$$q(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)^2 + \dots$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r},$$

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(x - x_0)^{n+r-1},$$

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(n+r-1)(x - x_0)^{n+r-2},$$

將 $y(x), y'(x), y''(x), p(x), q(x)$ 代入

$$(x - x_0)^2 y'' + (x - x_0) p(x) y' + q(x) y = 0$$

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(n+r-1) (x - x_0)^{n+r} \\ & + \left(a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots \right) \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r) (x - x_0)^{n+r} \\ & + \left(b_0 + b_1 (x - x_0) + b_2 (x - x_0)^2 + \dots \right) \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r} = 0 \end{aligned}$$

其中 $(x - x_0)^r$ 的 coefficient 為

$$c_0 r(r-1) + c_0 a_0 r + c_0 b_0$$

$$r(r-1) + a_0 r + b_0 = 0 \rightarrow \text{indicial equation}$$

2nd order

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}$$

當 linear DE 為 2nd order 時， r 可以由 $r(r-1) + a_0 r + b_0 = 0$ 求出
其中

$$a_0 = p(x_0)$$

$$p(x) = (x - x_0)P(x) \quad y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

$$b_0 = q(x_0)$$

$$q(x) = (x - x_0)^2 Q(x)$$

For the 2nd order case

$$r(r-1) + a_0 r + b_0 = 0 \quad \text{two roots: } r_1, r_2$$

(Case 1) $r_1 \neq r_2$ and r_1, r_2 are real, $r_2 - r_1 \neq \text{integer}$

★14-1

可以找出兩組 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}$ 的解

(Case 2) $r_1 \neq r_2$ and r_1, r_2 are real, $r_2 - r_1 = \text{integer}$

★14-2

有時可以找出兩組 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}$ 的解

有時一個解是 $y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r_1}$

另一個解是 $y_2(x) = C y_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^{n+r_2}$

(Case 3) $r_1 = r_2$ 時

★14-3

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r_1}$$

$$y_2(x) = Cy_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^{n+r_2} \quad C \text{ 一定不為 } 0$$

$$\text{或寫成 } y_2(x) = y_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{b}_n (x - x_0)^{n+r_2} \quad \tilde{b}_n = b_n / C$$

(Case 4) $r_1 \neq r_2$ and r_1, r_2 are complex

在此不予討論

6-3-7 Indicial Equation for Higher Order Case (補充)

當 linear DE 為 n^{th} order 時

$$y^{(n)} + P_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0$$

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r} \quad \text{當中的 } r \text{ 可以由}$$

$$\frac{r!}{(r-n)!} + a_{n-1,0} \frac{r!}{(r-n+1)!} + a_{n-2,0} \frac{r!}{(r-n+2)!} + \dots + a_{1,0} \frac{r!}{(r-1)!} + a_{0,0} = 0$$

求出

$$\text{其中 } a_{k,0} = p_k(x_0), \quad p_k(x_0) = (x - x_0)^{n-k} P_k(x_0)$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

6-3-8 本節需要注意的地方

(1) Index 「對齊」的計算要小心

(建議可以向 power 較小的對齊，否則會出現負的 k)

例如在 page 302 的 Step 2，一律對齊為 x^{k+r-1} 而非 x^{k+r}

(2) 若 $x = 0$ 為 regular singular point, 設 $x_0 = 0$ 即可

(3) 如果是 c_k 和 c_{k-1} (或 c_{k-1} 和 c_k) 的 recursive relation

其實有時可以立刻將 c_n 的式子觀察出來

(但是分母不可變為 0)

(4) Recursive relation 當中小心分母為 0 的情形 (如 page 308)

(5) 小心算出來的 $y_2(x)$ 和 $y_1(x)$ 相同的情形 (如 pages 308, 309)

(6) 別忘了將最後的解寫出
最後的解易出錯的地方：別忘了乘上 x^r

(7) Interval of solution 依然要考慮，
且 interval 不包括任何 singular point，
即使是 regular singular point

(8) 複習長除法

Section 6-4 Special Functions

Special cases of Sections 6-2 and 6-3

背熟

- Bessel's equation of order v

Sec 6-3

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - v^2)y = 0$$

$$J_v(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1+v+n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+v}$$

$$Y_v(x) = \frac{\cos v\pi J_v(x) - J_{-v}(x)}{\sin v\pi}$$

傳說

- Legendre's equation of order n

Sec 6-2

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

One of the solution: Legendre polynomials

(See page 338)

(本節這學期不在考試範圍內)

$x_0=0 \rightarrow$ regular singular point
 standard: $y'' + \frac{y'}{x} + \frac{x^2-v^2}{x^2} y$
 $P_1 = \frac{1}{x}, P_0 = \frac{x^2-v^2}{x^2}$

Solution: $c_1 J_v(x) + c_2 Y_v(x)$

$xP_1 = 1, x^2P_0 = x^2 - v^2$
 : 1st kind Bessel function
 $\Gamma(x)$: gamma function

: 2nd kind Bessel function

$x_0 = 0$ is an ordinary point

其他名詞

- Gamma function $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$

$$\Gamma(x) = (x-1)!$$

- modified Bessel equation of order v

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + v^2)y = 0 \quad \text{解 : } c_1 I_v(x) + c_2 K_v(x)$$

- modified Bessel equation of the 1st kind

$$I_v(x) = i^{-v} J_v(ix)$$

- modified Bessel equation of the 2nd kind

$$K_v(x) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-v}(x) - I_v(x)}{\sin v\pi}$$

- Bessel 的另一種變型

$$x^2 y'' + (1-2a)xy' + (b^2 c^2 x^{2c} + a^2 - p^2 c^2)y = 0$$

$$\text{解 } y = x^a [c_1 J_p(bx^c) + c_2 Y_p(bx^c)]$$

6.4.1 Bessel's Equation

6.4.1.1 Solving for Bessel's equation of order ν

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

Steps 1~3 將 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}$ 代入

經過一些計算 (See text pages 262, 263) 得出

$$c_0(r^2 - \nu^2)x^r + c_1((1+r)^2 - \nu^2)x^{r+1} + \sum_{k=2}^{\infty} [c_k((k+r)^2 - \nu^2) + c_{k-2}]x^{r+k} = 0$$

Step 4 $r^2 - \nu^2 = 0$ two roots: ν and $-\nu$

Step 5 $c_1((1+r)^2 - \nu^2) = 0$ $c_k = \frac{c_{k-2}}{\nu^2 - (k+r)^2}$
 $c_1 = 0$

$$c_k = \frac{c_{k-2}}{\nu^2 - (k+r)^2}$$

Step 6 當 $r = \nu$ $c_k = -\frac{c_{k-2}}{k(k+2\nu)}$ 當 $r = -\nu$ $c_k = -\frac{c_{k-2}}{k(k-2\nu)}$

由於 $c_1 = 0, c_3 = c_5 = c_7 = c_9 = \dots = 0$

$$c_{2n} = (-1)^n \frac{c_0}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots \cdots 2n \cdot (2+2\nu)(4+2\nu)(6+2\nu) \cdots \cdots (2n+2\nu)}$$

$$= \frac{(-1)^n c_0}{2^{2n} n! (1+\nu)(2+\nu)(3+\nu) \cdots \cdots (n+\nu)} \quad \text{when } r = \nu$$

$$c_{2n} = (-1)^n \frac{c_0}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots \cdots 2n \cdot (2-2\nu)(4-2\nu)(6-2\nu) \cdots \cdots (2n-2\nu)}$$

$$= \frac{(-1)^n c_0}{2^{2n} n! (1-\nu)(2-\nu)(3-\nu) \cdots \cdots (n-\nu)} \quad \text{when } r = -\nu$$

6.4.1.2 Gamma function: a generalization of $n!$

(Note 1)

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

properties of Gamma function

(1) $\Gamma(n+1) = n!$ when n is a positive integer


$$\Gamma(1) = 0! = 1$$

(2) $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

參照課本 Appendix 1

(3) $\Gamma(n) \rightarrow \infty$ when n is a negative integer or $n = 0$

$$(4) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad \Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$$



6.4.1.1 回到 Solving for Bessel function

326

$$c_{2n} = \frac{(-1)^n c_0}{2^{2n} n! (1+\nu)(2+\nu)(3+\nu)\cdots\cdots(n+\nu)} \quad \text{when } r = \nu$$

$$\text{Set } c_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(1+\nu)}$$

$$\begin{aligned}
 c_{2n} &= \frac{(-1)^n}{2^{2n+\nu} n! (1+\nu)(2+\nu)(3+\nu)\cdots\cdots(n+\nu) \Gamma(1+\nu)} \\
 &= \frac{(-1)^n}{2^{2n+\nu} n! (2+\nu)(3+\nu)\cdots\cdots(n+\nu) \Gamma(2+\nu)} \quad \Gamma(2+\nu) = (1+\nu) \Gamma(1+\nu) \\
 &= \frac{(-1)^n}{2^{2n+\nu} n! (3+\nu)\cdots\cdots(n+\nu) \Gamma(3+\nu)} \quad \Gamma(3+\nu) = (2+\nu) \Gamma(2+\nu) \\
 &\vdots \\
 &= \frac{(-1)^n}{2^{2n+\nu} n! \Gamma(n+\nu+1)}
 \end{aligned}$$

同理，當 $r = -v$ set $c_0 = \frac{1}{2^{-v}\Gamma(1-v)}$

$$c_{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{2n-v} n! \Gamma(n-v+1)}$$

Two independent solutions of the Bessel's equation

代入 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}$

When $r = v$

$$J_v(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1+v+n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+v}$$

When $r = -v$

$$J_{-v}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(1-v+n)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n-v}$$

稱作 Bessel functions of the first kind of order v and $-v$

注意，兩個 roots 的差為 2ν

(1) 當 2ν 不為整數時，Bessel's equation 的解即為

$$c_1J_\nu(x) + c_2J_{-\nu}(x) \quad (\text{也可表示成 } c_1J_\nu(x) + c_2Y_\nu(x))$$

(2) 當 2ν 為整數，但 $\nu = m + 1/2$ (m 是一個整數) 時，Bessel's equation 的解亦為 $c_1J_\nu(x) + c_2J_{-\nu}(x)$ ($\text{也可表示成 } c_1J_\nu(x) + c_2Y_\nu(x)$)

(3) 當 2ν 為整數，且 ν 是一個整數時，Bessel's equation 的解為

$$c_1J_\nu(x) + c_2Y_\nu(x)$$

$Y_\nu(x)$: Bessel function of the second kind of order ν

(見後頁)

(Note 2)

$Y_v(x)$: Bessel function of the second kind of order v

$$Y_v(x) = \frac{\cos v\pi J_v(x) - J_{-v}(x)}{\sin v\pi}$$

當 m 為整數時， $Y_m(x)$ 定義成

$$Y_m(x) = \lim_{v \rightarrow m} \frac{\cos v\pi J_v(x) - J_{-v}(x)}{\sin v\pi}$$


用 L'Hopital's rule 來算

$$Y_m(x) = \lim_{v \rightarrow m} \frac{-\pi \sin v\pi J_v(x) + \cos v\pi \frac{\partial}{\partial v} J_v(x) - \frac{\partial}{\partial v} J_{-v}(x)}{\pi \cos v\pi}$$

6.4.1.4 Bessel function of the 1st kind (order m 為整數時)的性質

(1) $J_0(0) = 1$, $J_m(0) = 0$ for $m \neq 0$

(2) Zero crossing 的位置，隨著 m 增加而越來越遠 (見 Table 6.4.1)



$$(3) \quad J_m(-x) = (-1)^m J_m(x) \quad \text{when } m \text{ is an integer}$$

$$(4) \quad J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x) \quad \text{when } m \text{ is an integer}$$


$$(5) \quad \frac{d}{dx} \left[x^{-\nu} J_\nu(x) \right] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$$

$$(6) \quad \frac{d}{dx} \left[x^\nu J_\nu(x) \right] = x^\nu J_{\nu-1}(x)$$

見 Example 6, text pages 268, 269

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} Y_m(x) = -\infty$$

(2) Zero crossing 的位置，隨著 m 增加而越來越遠



6.4.1.6 Bessel's equation 的變型

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - v^2)y = 0 \quad \text{解: } c_1 J_v(x) + c_2 Y_v(x)$$

$$(A) \quad x^2 y'' + xy' + (\alpha^2 x^2 - v^2)y = 0 \quad \text{解: } c_1 J_v(\alpha x) + c_2 Y_v(\alpha x)$$

Proof: Set $t = \alpha x$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx} \frac{dy}{dt} = \alpha \frac{dy}{dt}$$

$$\text{Similarly, } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dt}{dx} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \alpha \frac{d}{dt} \left(\alpha \frac{dy}{dt} \right) = \alpha^2 \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\text{原式} = x^2 y'' + xy' + (\alpha^2 x^2 - v^2)y = \frac{t^2}{\alpha^2} \alpha^2 \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{t}{\alpha} \alpha \frac{dy}{dt} + (\alpha^2 \frac{t^2}{\alpha^2} - v^2)y$$

$$= t^2 \frac{d^2y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} + (t^2 - v^2)y = 0 \quad \boxed{\rightarrow \text{對 } t \text{ 而言是 Bessel equation}}$$

$$y = c_1 J_v(t) + c_2 Y_v(t) = c_1 J_v(\alpha x) + c_2 Y_v(\alpha x)$$

(B) modified Bessel equation of order ν

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + \nu^2)y = 0 \quad \text{解 : } c_1 I_\nu(x) + c_2 K_\nu(x)$$

其中 $I_\nu(x) = i^{-\nu} J_\nu(ix)$ 稱作是 modified Bessel function of the first kind of order ν

$$K_\nu(x) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)}{\sin \nu \pi} \quad \text{稱作是 modified Bessel function of the second kind of order } \nu$$

當 ν 為整數時，也是取 limit

$$(C) \boxed{x^2 y'' + (1 - 2a)xy' + (b^2 c^2 x^{2c} + a^2 - p^2 c^2)y = 0}$$

解： $y = x^a [c_1 J_p(bx^c) + c_2 Y_p(bx^c)]$

式子有點複雜，但可以用來解許多物理上的問題

Example 4 (text page 266)

$$\begin{array}{l} xy'' + 3y' + 9y = 0 \\ \downarrow \\ x^2 y'' + 3xy' + 9xy = 0 \end{array}$$

6.4.2 Legendre's Equation

6.4.2.1 Legendre's Equation

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \quad \text{代入，得出 (過程見text pages 270, 271)}$$

Two linearly independent solutions are

$$y_1(x) = c_0 \left[1 - \frac{n(n+1)}{2!} x^2 + \frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!} x^4 - \frac{(n-4)(n-2)n(n+1)(n+3)(n+5)}{6!} x^6 + \dots \right]$$

$$y_2(x) = c_0 \left[x - \frac{(n-1)(n+2)}{3!} x^3 + \frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!} x^5 - \frac{(n-5)(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)(n+6)}{7!} x^7 + \dots \right]$$

- (a) When n is not an integer, both the two solutions have infinite number of terms.
- (b) When n is an even integer, $y_1(x)$ has finite number of terms.

In $y_1(x)$, the coefficient of x^k is zero when $k > n$.

- (c) When n is an odd integer, $y_2(x)$ has finite number of terms.

In $y_2(x)$, the coefficient of x^k is zero when $k > n$.

$y_1(x)$ when n is an even integer and $y_2(x)$ when n is an odd integer are called the Legendre polynomials (denoted by $P_n(x)$).

通常選

$$c_0 = (-1)^{n/2} \frac{1 \cdot 3 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdots n} \quad c_1 = (-1)^{(n-1)/2} \frac{1 \cdot 3 \cdots n}{2 \cdot 4 \cdots (n-1)}$$

(讓 $P_n(1)$ 一律等於 1)

When n is a non-negative integer, one of the solutions is the n^{th} order polynomial.

由 $y_1(x)$

$$P_0(x) = 1$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x + 3)$$

由 $y_2(x)$


$$P_1(x) = x$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$

(Note 3)

Legendre polynomials



Interval:

$$x \in [-1, 1]$$



6.4.2.2 Properties of Legendre Polynomials

$$(1) P_n(-x) = (-1)^n P_n(x) \quad \text{even / odd symmetry}$$

$$(2) P_n(1) = 1 \quad P_n(-1) = (-1)^n$$

$$(3) P_n(0) = 0 \quad \text{when } n \text{ is odd}$$

$$(4) P_n'(0) = 0 \quad \text{when } n \text{ is even}$$

$$(5) (n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0 \quad \text{recursive relation}$$

$$(6) P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad \text{Rodrigues' formula}$$

$$(7) \quad \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0 \quad \text{If } m \neq n \quad \text{orthogonality property}$$

(Note 4)

(8) 若任何在 $x \in [-1, 1]$ 區間為 continuous 的函式 $f(x)$

皆可表示為

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x)$$

由於 $\int f(x) P_m(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int P_n(x) P_m(x) dx = a_n \int P_m(x) P_m(x) dx$

根據 orthogonality property

所以 $a_n = \frac{\int f(x) P_m(x) dx}{\int P_m(x) P_m(x) dx}$

Orthogonality property 才是 Legendre polynomials 最重要的性質

Review of Chapter 6

解法適用範圍：Linear DE，且 coefficients 最好為 polynomials

$$y^{(n)} + P_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + P_1(x)y' + P_0(x)y = 0$$

- 當 $P_m(x)$ 在 $x = x_0$ 時為 analytic

x_0 為 ordinary point $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ 代入求解

- 當 $P_m(x)$ 在 $x = x_0$ 時不為 analytic

但是 $(x - x_0)^{n-m}P_m(x)$ 在 $x = x_0$ 時為 analytic

x_0 為 regular singular point $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}$ 代入求解

有時，另一個解為 $Cy_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^{n+r_2}$

Exercise for practice

Sec. 6-1: 4, 9, 12, 20, 22, 24, 30, 32, 34

Sec. 6-2: 2, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 27

Sec. 6-3: 4, 9, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 36

Review 6 6, 7, 10, 14, 19, 20