

數論轉換介紹

Number Theoretic Transform (NTT)

2026/04/29

請 gpt 幫我生投影片

ChatGPT ▾

↑ 分享

你能夠直接產出odp格式的投影片給我嗎，大概5頁就好，我自己加到投影片中間

我會幫你製作 5 頁 ODP 格式的投影片，內容涵蓋：

1. **數論轉換基礎** (模運算與原根)
2. **NTT 的基本步驟** (簡單範例)
3. **NTT 與 FFT 的比較** (直覺理解)
4. **NTT 的應用場景** (密碼學、快速多項式運算)
5. **習題與練習** (手算與程式實作建議)

稍等一下，我馬上生成 ODP 投影片。



數論轉換補充投影片

補充基礎概念、範例與應用

數論轉換基礎

- - 模運算： $a \equiv b \pmod{m}$
- - 原根的概念：找到一個數 g ，使得 $g^k \pmod{m}$ 遍歷所有非零元素
- - 選取適當的質數 p ，使得 $p-1$ 有較小的質因數

NTT 的基本步驟

- 1. 選擇適當的模數 p 和原根 g
- 2. 建立 NTT 變換矩陣
- 3. 計算 NTT，類似 FFT 的蝶形運算
- 4. 進行逆變換來還原原始數據

NTT 與 FFT 的比較

- - FFT 使用浮點數，NTT 使用整數模運算
- - NTT 不受浮點誤差影響，適用於精確計算
- - NTT 適用於密碼學與計算機代數

NTT 的應用場景

- - 密碼學（如同態加密）
- - 多項式乘法加速
- - 競程（如大數計算與快速卷積）

習題與練習

- 1. 計算 $3^4 \bmod 7$ 是多少？
- 2. 找到 7 的一個原根
- 3. 手算一個簡單的 NTT 變換
- 4. 嘗試用 Python/Octave 實作簡單的 NTT

XIV. Number Theoretic Transform (NTT)

• 14-A Definition

Number Theoretic Transform and Its Inverse

$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) \alpha^{nk} \pmod{M}, k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$f(n) = N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \alpha^{-nk} \pmod{M}, n = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad \begin{array}{l} \text{NTT} \\ f(n) \Leftrightarrow F(k) \\ \text{INTT} \end{array}$$

Note :

(1) M is a **prime number**, \pmod{M} : 是指除以 M 的餘數

(2) N is a factor of $M-1$

(Note: when $N \neq 1$, N must be relatively prime to M)

(3) N^{-1} is **an integer** that satisfies $(N^{-1})N \pmod{M} = 1$

(When $N = M-1$, $N^{-1} = M-1$), it is also called the inverse of $N \pmod{M}$)

(4) α is a root of unity of order N

$$\alpha^N \equiv 1 \pmod{M}$$

$$\alpha^k \not\equiv 1 \pmod{M}, k = 1, 2, \dots, N - 1$$

When α satisfies the above equations and $N = M - 1$, we call α the “primitive root”.

$$\alpha^k \not\equiv 1 \pmod{M} \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, M - 2$$

$$\alpha^{M-1} \equiv 1 \pmod{M}$$

α^{-1} 的求法與 N^{-1} 相似

α^{-1} is an integer that satisfies $(\alpha^{-1})\alpha \pmod{M} = 1$

Example 1:

$M = 5$ $\alpha = 2$ $\alpha^1 = 2 \pmod{5}$ $\alpha^2 = 4 \pmod{5}$ $\alpha^3 = 3 \pmod{5}$ $\alpha^4 = 1 \pmod{5}$

(1) When $N = 4$

$$\begin{bmatrix} F[0] \\ F[1] \\ F[2] \\ F[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f[0] \\ f[1] \\ f[2] \\ f[3] \end{bmatrix}$$

(2) When $N = 2$

$$\begin{bmatrix} F[0] \\ F[1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f[0] \\ f[1] \end{bmatrix}$$

Example 2:

$M = 7$, $N = 6$: α cannot be 2 but can be 3.

$$\alpha = 2: \alpha^1 = 2 \pmod{7} \quad \alpha^2 = 4 \pmod{7} \quad \alpha^3 = 1 \pmod{7}$$

$$\alpha = 3: \alpha^1 = 3 \pmod{7} \quad \alpha^2 = 2 \pmod{7} \quad \alpha^3 = 6 \pmod{7}$$

$$\alpha^4 = 4 \pmod{7} \quad \alpha^5 = 5 \pmod{7} \quad \alpha^6 = 1 \pmod{7}$$

Advantages of the NTT:

1. 使用整數，比較容易運算
2. 使用整數無誤差
3. 很多性質都跟 DFT 相同
(幾乎完美的複製體)



Disadvantages of the NTT:

1. 只能對整數做轉換
2. 不容易找到 root of unity
3. 較缺乏物理意義
 - (1) DFT 的 basis 是三角函數的波
 - (2) DFT 的特徵向量仍像是 Hermite-Gaussian 函數，這個性質讓 DFT 可以做 fractional ，但是 NTT 特徵向量沒有這樣的性質

• 14-B 關於餘數我們應該要知道的性質

(1) $x \pmod{M}$ 的值，必定為 $0 \sim M-1$ 之間

(2) $a + b \pmod{M} = \{a \pmod{M} + b \pmod{M}\} \pmod{M}$

例： $78 + 123 \pmod{5} = 3 + 3 \pmod{5} = 1$

(Proof): If $a = a_1M + a_2$ and $b = b_1M + b_2$, then

$$a + b = (a_1 + b_1)M + a_2 + b_2$$

(3) $a \times b \pmod{M} = \{a \pmod{M} \times b \pmod{M}\} \pmod{M}$

例： $78 \times 123 \pmod{5} = 3 \times 3 \pmod{5} = 4$

(Proof): If $a = a_1M + a_2$ and $b = b_1M + b_2$, then

$$a \times b = (a_1 b_1 M + a_1 b_2 + a_2 b_1)M + a_2 b_2$$

(4) 給定 a ，如何計算出 $a^{-1} \bmod M$?

答案：

1. 首先前面說 M 是質數，表示 $\gcd(a, M) = 1$
2. Bezout's Lemma 說 if $\gcd(a, b) = d$, 則存在 s, t 使得 $as + bt = d$
3. 所以存在 $as + Mt = 1$ ，兩邊 $\bmod M$ 後，就可以得到 s 就是 a 的 inverse

至於怎麼求出 s, t ，就是要使用 the Extended Euclidean Algorithm or Blankinship's Method，中文叫做輾轉相除法。

原理：

1. Euclidean Algorithm 的原理是若 $a = bq + r$ 則 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$
2. Extended Euclidean Algorithm 就是把求 \gcd 的過程紀錄下來然後一路反推

✓ Example 1.10.1

For our example, we will continue with the numbers used in [Example 1.8.1](#) from [Section 1.8](#). There we found that $\gcd(803, 154) = 11$. Bezout's Lemma guarantees that $11 = 803s + 154t$ for some integers s, t . Let us determine a possible choice of s and t .

In [Example 1.8.1](#) we found the following:

$$\begin{aligned} 803 &= 154 \cdot 5 + 33 \\ 154 &= 33 \cdot 4 + 22 \\ 33 &= 22 \cdot 1 + 11 \\ 22 &= 11 \cdot 2 + 0. \end{aligned}$$

Rearranging and reordering all but the last of these equations, we get

$$\begin{aligned} 11 &= 33 - 22 \cdot 1 \\ 22 &= 154 - 33 \cdot 4 \\ 33 &= 803 - 154 \cdot 5 \end{aligned}$$

We now set about to find an expression of 11 as a linear combination of 803 and 154. Starting with the equation $11 = 33 - 22 \cdot 1$, we substitute $22 = 154 - 33 \cdot 4$ (the next equation) to obtain

$$\begin{aligned} 11 &= 33 - (154 - 33 \cdot 4) \cdot 1 \\ &= 5 \cdot 33 - 1 \cdot 154. \end{aligned}$$

Now we will substitute for 33, using the equation $33 = 803 - 154 \cdot 5$ above:

$$11 = 5 \cdot (803 - 154 \cdot 5) - 1 \cdot 154$$

and finally obtain

$$11 = 5 \cdot 803 - 26 \cdot 154.$$

請求出 47 在 101 的 inverse

① $101 = 47 \times 2 + 7$

② $47 = 7 \times 6 + 5$

③ $7 = 5 + 2$

④ $5 = 2 \times 2 + 1$

① $5 - 2 \times 2 = 1, \because 5 = 2 \times 2 + 1$

② $5 - (7 - 5) \times 2 = 1, \because 7 = 5 + 2$

③ $5 \times 3 - 7 \times 2 = 1$

④ $(47 - 7 \times 6) \times 3 - 7 \times 2 = 1, \because 47 = 7 \times 6 + 5$

⑤ $47 \times 3 - 7 \times 20 = 1$

⑥ $47 \times 3 - (101 - 47 \times 2) \times 20 = 1, \because 101 = 47 \times 2 + 7$

⑦ $47 \times 43 - 101 \times 20 = 1$ 答案 43 即為所求

(5) 給定 a ，如何計算出 $a^n \bmod M$?

動機：回憶一下 NTT 的定義



$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) \alpha^{nk} \pmod{M}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$f(n) = N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \alpha^{-nk} \pmod{M}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$f(n) \underset{INTT}{\overset{NTT}{\rightleftharpoons}} F(k)$$

答案：

1. 乍聽之下這是很蠢的問題，不就是先把 a^n 算出來，然後 mod M
2. 但是我們真的有辦法把 a^n 算出來嗎？當 a 和 n 都不小的時候，電腦會爆
3. 舉例： $37^{89} \bmod 101$

所以實際上，我們先把指數分解成 binary

然後看到 0 就平方

看到 1 就平方後再乘上 37

```
z=37;n=89;N=101;
```

```
x=dec2bin(n);
```

```
  t=1;
```

```
  for k=1:length(x)
```

```
    if x(k)=='0'
```

```
      t=mod(t.^2,N);
```

```
    else
```

```
      t=mod((t.^2).*z,N);
```

```
    endif
```

```
  endfor
```

```
  y=t;
```



答案的後續：

1. 看起來已經有個 happy ending 了，趕快來試試看 $37^{140548} \bmod 101$
BUT!

還有一個更快的高招，費馬小定理

 Theorem 1.24.2: Fermat's Little Theorem

If p is prime and a is relatively prime to p then

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

範例：

Ex1: $p=5, a=2, 2^4=16=1 \pmod{5}$

Ex2: $p=13, a=3, 3^2=9, 3^3=27=1 \pmod{13}$ 所以 $3^{12}=(3^3)^4=1^4=1 \pmod{13}$

如何使用費馬小定理更快算出 $37^{140548} \bmod 101$ 呢

首先我們知道 $37^{100} = 1 \pmod{101}$

所以 $37^{140500} = 1 \pmod{101}$

也就是說

別人還在想辦法把 140548 變成 2 進位

你卻只要算 48 的 2 進位就好



補充教材： mod 與藝術

- <https://franherr.github.io/files/curve-stitching.pdf>



(6) 既然講到費馬小定理，就補充兩個數論的定理吧

1. 中國剩餘定理

2. Wilson 定理

Theorem 1.23.1: Chinese Remainder Theorem

Let m_1, m_2, \dots, m_k be natural numbers such that each is greater than 1, and every pair of them is relatively prime. Let $M = m_1 m_2 \cdots m_k$, and let b_1, b_2, \dots, b_k be integers. The system of congruences

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1};$$

$$x \equiv b_2 \pmod{m_2};$$

$$\vdots$$

$$x \equiv b_k \pmod{m_k};$$

has a unique solution in the set $\{0, 1, 2, \dots, M - 1\}$.

Theorem 1.24.1: Wilson's Theorem

If p is a prime, then

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Q: 一個數介於 0~34 之間，被 5 除餘 2，被 7 除則餘 3

請問某數為多少

A: 分開處理，

甲：先找到一個數被 5 除餘 0，被 7 除餘 3

乙：再找一個數，被 5 除餘 2，被 7 除餘 0

兩者相加即為所求

甲如何達成？既然被 5 整除，叫它 $5K$ 吧。又知道 5 在 mod 7 的 inverse 是 3 ($3 \times 5 = 15 = 1 \pmod{7}$)，所以如果要被 7 除餘 3 的話，就再乘以 3 即可，換句話說， $5 \times 3 \times 3 = 45$ 就是 5 的倍數，且 mod 7 為 3

正規化，變成餘 1


但我們要餘 3，所以再乘 3

同理可以得到乙應該是 $3 \times 7 \times 2 = 42$ ($3^{-1} = 7 \pmod{5}$)

兩者相加為 $87 = 17 \pmod{35}$ ，所以答案是 17

另外一種解法

	0	1	2	3	4
0	0		7		
1		1		8	
2			2		9
3	10			3	
4		11			4
5	5		12		
6		6		13	



中國剩餘定理實戰

Q: 超過兩個數怎麼辦？一個數被 3 除餘 2，被 5 除餘 1，被 7 除餘 4，答案在 0~104

A: 一樣分開處理

$$35a+21b+15c=2 \pmod{3}$$

$$35a+21b+15c=1 \pmod{5}$$

$$35a+21b+15c=4 \pmod{7}$$

=>

$$2a=2$$

$$b=1$$

$$c=4$$

$35 \times 1 + 21 \times 1 + 15 \times 4 = 116 = 11 \pmod{105}$ ，所以答案是 11

Wilson 定理，與它的用途

(中國剩餘定理的用途太廣，大家自己搜尋)

以 $p=11$ 為例 $10!=10 \times 9 \times 8 \times \dots \times 1 = 10 = -1 \pmod{11}$

如何計算 2^{-1}

可以這樣想： $(p-2)! = 1$, $(p-2) \times (p-3)! = 1$, 所以 $(p-3)!$ 就是 -2 的 inverse

所以 2 的 inverse 就是 $-(p-3)!$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
!	1	2	6	2	10	5	2	5	1	10
inv	1	-5							5	10

如何計算 3^{-1}

可以這樣想： $(p-2)! = 1$, $(p-2) \times (p-3)! = 1$, $(p-2) \times (p-3) \times (p-4)! = 1$

所以 $(p-3)$ 的 inverse 就是 $(p-2) \times (p-4)!$

所以 3 的 inverse 就是 $-(p-2) \times (p-4)!$

如何計算 4^{-1}

$(p-2)(p-3)(p-4) \times (p-5)! = 1$, 所以 $3! \times (p-5)!$ 就是 $(p-4)$ 的 inverse

....

簡言之，可以透過計算階層，利用 $O(N)$ 的乘法，算出所有的 inverse

7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
!	1	2	6	2	10	5	2	5	1	10
inv	1	-5	-7				8	7	5	10

小結：

(1) 如果只求某個特定數的 inverse ，請使用輾轉相除法

(2) 如果想求所有的 inverse ，可使用 Wilson 定理

思考一下，輾轉相除法是 $O(?)$



另外，如果做 NTT ，只需要乘法就好

那麼由於 $\text{mod } M$ 中，只有 M^2 個可能的加法， M^2 個可能的乘法

可事先將加法和乘法的結果存在記憶體當中

需要時再 “LUT”

LUT : lookup table

• 14-C Properties of Number Theoretic Transforms

P.1) Orthogonality Principle

$$S_N = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^{nk} \alpha^{-n\ell} = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^{n(k-\ell)} = N \cdot \delta_{k,\ell}$$

proof : for $k = \ell$, $S_N = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^0 = N$

for $k \neq \ell$, $(\alpha^{k-\ell} - 1) S_N = (\alpha^{k-\ell} - 1) \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^{n(k-\ell)} = \alpha^{N(k-\ell)} - 1 = 1 - 1 = 0$

$\because \alpha^{k-\ell} \neq 1 \quad \therefore S_N = 0$

P.2) The NTT and INTT are exact inverse

proof : $g(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \alpha^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{\ell=0}^{N-1} f(\ell) \alpha^{\ell k} \right) \alpha^{-nk}$

$$= \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} f(\ell) \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{(\ell-n)k} = \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} f(\ell) \cdot N \delta_{\ell,n} = f(n)$$

P.3) Symmetry

$$f(n) = f(N-n) \quad \stackrel{\text{NTT}}{\Leftrightarrow} \quad F(k) = F(N-k)$$

$$f(n) = -f(N-n) \quad \stackrel{\text{NTT}}{\Leftrightarrow} \quad F(k) = -F(N-k)$$

P.4) INNT from NTT

$$f(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \alpha^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{(-k)=0}^{N-1} F(-k) \alpha^{nk} = \text{NTT of } \frac{1}{N} F(-k)$$

Algorithm for calculating the INNT from the NTT

(1) $F(-k)$: time reverse

$$F_0, F_1, F_2, \dots, F_{N-1} \xrightarrow[\text{reverse}]{\text{time}} F_0, F_{N-1}, \dots, F_2, F_1$$

(2) NTT[$F(-k)$]

(3) 乘上 N^{-1}

P.5) Shift Theorem

$$f(n + \ell) \leftrightarrow F(k) \alpha^{-\ell k}$$

$$f(n) \alpha^{n\ell} \leftrightarrow F(k + \ell)$$

P.6) Parseval's Theorem

$$N \sum_{n=0}^{N-1} f(n) f(-n) = \sum_{k=0}^{N-1} F^2(k)$$

$$N \sum_{n=0}^{N-1} f(n)^2 = \sum_{k=0}^{N-1} F(k)F(-k)$$

P.7) Linearity

$$a f(n) + b g(n) \leftrightarrow a F(k) + b G(k)$$

P.8) Reflection

If $f(n) \leftrightarrow F(k)$ then

$$f(n) \leftrightarrow F(k) \qquad f(-n) \leftrightarrow F(-k)$$

★ ★ **P.9) Circular Convolution** (the same as that of the DFT)³³

If $f(n) \leftrightarrow F(k)$

$g(n) \leftrightarrow G(k)$

then $f(n) \otimes g(n) \leftrightarrow F(k)G(k)$

i.e., $f(n) \otimes g(n) = INTT \{ NTT [f(n)] NTT [g(n)] \}$

$f(n) \cdot g(n) \leftrightarrow \frac{1}{N} F(k) \otimes G(k)$

(Proof): $INNT (NNT (f[n]) NNT (g[n])) = N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{-nk} F(k)G(k)$

$= N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{-nk} \sum_{m=0}^{N-1} f[m] \alpha^{mk} \sum_{q=0}^{N-1} g[q] \alpha^{qk}$

$= \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{q=0}^{N-1} f[m]g[q] N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{-nk} \alpha^{mk} \alpha^{qk}$

We apply the fact that

$$\sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{nk} = \begin{cases} 1 & \text{if } n \text{ is a multiple of } N \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$= \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{q=0}^{N-1} f[m]g[q] \delta [((m + q - n))_N]$

When $q = ((n - m))_N$
 $m + q - n$ is a multiple of N

$= \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{q=0}^{N-1} f[m]g[((n - m))_N] = f[n] \otimes g[n]$

• 14-D Complex Number Theoretic Transform (CNT)³⁴

The integer field Z_M can be extended to complex integer field

If the following equation does not have a sol. in Z_M

$$x^2 = -1 \pmod{M} \text{ 無解}$$

This means (-1) does not have a square root

When $M = 4k + 1$, there is a solution for $x^2 = -1 \pmod{M}$.

When $M = 4k + 3$, there is no solution for $x^2 = -1 \pmod{M}$.

For example, when $M = 13$, $8^2 = -1 \pmod{13}$.

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 3, \quad 2^5 = 6, \quad 2^6 = 12 = -1,$$

$$2^7 = 11, \quad 2^8 = 9, \quad 2^9 = 5, \quad 2^{10} = 10, \quad 2^{11} = 7, \quad 2^{12} = 1$$

When $M = 11$, there is no solution for $x^2 = -1 \pmod{M}$.

If there is no solution for $x^2 = -1 \pmod{M}$, we can define an imaginary number i such that

$$i^2 = -1 \pmod{M}$$

Then, “ i ” will play a similar role over finite field Z_M such that plays over the complex field.

$$(a + i b) \pm (c + i d) = (a \pm c) + i (b \pm d)$$

$$\begin{aligned} (a + i b) \cdot (c + i d) &= ac + i^2 bd + i bc + i ad \\ &= (ac - bd) + i (bc + ad) \end{aligned}$$

• 14-E Legendre sequence and Gauss sum

ChatGPT ▾



MU



Legendre序列 (Legendre sequence) 和高斯和 (Gauss sum) 是數論和數字信號處理中的重要概念，兩者之間有一定的關聯。

Legendre序列

Legendre序列是基於Legendre符號定義的一個二進制序列。給定一個奇素數 p ，Legendre符號 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 定義如下：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } a \equiv 0 \pmod{p} \\ 1 & \text{如果 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩餘} \\ -1 & \text{如果 } a \text{ 不是模 } p \text{ 的二次剩餘} \end{cases}$$

Legendre序列 $\{a_n\}$ 是由Legendre符號生成的，定義如下：

$$a_n = \left(\frac{n}{p}\right) \text{ 對於 } n = 0, 1, 2, \dots, p-1$$

這個序列長度為 p ，且其中的值是 -1 和 1 。



https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_Gauss_sum

高斯和

高斯和是一類複雜數值和，定義為：

$$G(\chi) = \sum_{n=0}^{p-1} \chi(n) e^{2\pi i n/p}$$

其中 χ 是一個模 p 的狄利克雷特徵 (Dirichlet character)，特別是當 χ 是Legendre符號時，高斯和稱為Legendre高斯和。

對於Legendre符號，對應的高斯和記為 $G\left(\left(\frac{\cdot}{p}\right)\right)$ ，即：

$$G = \sum_{n=0}^{p-1} \left(\frac{n}{p}\right) e^{2\pi i n/p}$$

關聯

Legendre序列和高斯和之間的關聯在於，Legendre序列的結構和性質對應於高斯和的性質。具體而言，Legendre高斯和的模長度為：

$$|G| = \sqrt{p}$$

這是一個重要的結果，因為它揭示了Legendre符號生成的二進制序列的自相關性質。Legendre序列在很多應用中具有良好的自相關性質，這使得它們在數字通訊和密碼學中具有重要應用。

Let $M = 11, N = 5$, primitive root $g = 2, \alpha = g^2 = 4$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 5 & 9 & 3 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 9 \\ 1 & 9 & 4 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 9 & 5 & 4 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

比較一下， Fx 和 $\text{fft}(x)$ 有何相似

$$Fx = [0 \ 4 \ 7 \ 7 \ 4]$$

注意在 mod 11 中 4 的平方就是 5

換句話說 4 就是 根號 5

```
>> fft([0 1 -1 -1 1]')
ans =
      0
  2.2361
 -2.2361
 -2.2361
  2.2361
>> |
```

• 14-F Impulse train and Ramanujan's sum

假設長度 N 有一個因數 d ，則 Impulse train 為

An 1D impulse train $\Pi_{N,d}$ is

$$\Pi_{N,d}(n) = \begin{cases} 1 & n = md, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

with $d|N$. Alternatively, we can write

$$\Pi_{N,d}(n) = \sum_{m=0}^{\frac{N}{d}-1} \delta(n - md).$$

範例： [1 0 0 1 0 0] 為 $N=6, d=3$ 的 impulse train

[1 0 1 0 1 0] 為 $N=6, d=2$ 的 impulse train

注意： [1 0 0 0 0 0] 為 $N=6, d=6$ 的 impulse train

[1 1 1 1 1 1] 為 $N=6, d=1$ 的 impulse train

Impulse train 的性質：做完轉換後變成 weighted impulse train

範例：

[1 0 0 1 0 0] 做 DFT 之後，變成 [2 0 2 0 2 0]

[1 1 1 1 1 1] 做 DFT 之後，變成 [6 0 0 0 0 0]

注意從 N, d 的 impulse train，變成 $N, N/d$ 的

請大家想想看

這個性質在 NTT 中會不會成立呢


M=13 為例做一個 6 點的 NTT

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 12 & 9 & 10 \\ 1 & 3 & 9 & 1 & 3 & 9 \\ 1 & 12 & 1 & 12 & 1 & 12 \\ 1 & 9 & 3 & 1 & 9 & 3 \\ 1 & 10 & 9 & 12 & 3 & 4 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

比較一下， Fx 和 $\text{fft}(x)$ 有何相似， Fy 和 $\text{fft}(y)$ 呢？

Ramanujan's sum

Ramanujan's sum

 12 languages ▾

[Article](#) [Talk](#)

[Read](#) [Edit](#) [View history](#) [Tools](#) ▾

From Wikipedia, the free encyclopedia

Not to be confused with [Ramanujan summation](#).

In [number theory](#), **Ramanujan's sum**, usually denoted $c_q(n)$, is a function of two positive integer variables q and n defined by the formula

$$c_q(n) = \sum_{\substack{1 \leq a \leq q \\ (a,q)=1}} e^{2\pi i \frac{a}{q} n},$$

where $(a, q) = 1$ means that a only takes on values [coprime](#) to q .

Ramanujan's sum

What is Ramanujan's Sum

Let signal length $N = 12$

Time Domain

$$\begin{aligned}
 n &= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \\
 x_{12}(n) &= [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] \\
 x_6(n) &= [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] \\
 x_4(n) &= [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] \\
 x_3(n) &= [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] \\
 x_2(n) &= [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] \\
 x_1(n) &= [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
 \end{aligned}$$

After DFT(Ramanujan's Sum)

$$\begin{aligned}
 k &= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \\
 \hat{x}_{12}(k) &= [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] \\
 \hat{x}_6(k) &= [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1] \\
 \hat{x}_4(k) &= [2, -1, -1, 2, -1, -1, 2, -1, -1, 2, -1, -1] \\
 \hat{x}_3(k) &= [2, 0, -2, 0, 2, 0, -2, 0, 2, 0, -2, 0] \\
 \hat{x}_2(k) &= [2, 1, -1, -2, -1, 1, 2, 1, -1, -2, -1, 1] \\
 \hat{x}_1(k) &= [4, 0, 2, 0, -2, 0, -4, 0, -2, 0, 2, 0]
 \end{aligned}$$

簡單說：Ramanujan's sum 可以看作把特定的 0-1 sequence 去做 DFT

這個特定的 0-1 sequence 我叫 gcd-delta function

gcd-delta

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Impulse train

gcd-delta

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Impulse train

兩邊去做 DFT

Ramanujan's sum


Weighted
Impulse train

Take DFT at both side in eq. (15),

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

It shows Ramanujan's sum can be easily calculate by impulse train, without DFT.

最後結論，大家可以把 DFT 的地方換成 NTT，結論還是一樣



- **14-G Applications of the NTT**

NTT 適合作 convolution

但是有不少的限制

新的應用： encryption (密碼學)

CDMA

References:

- (1) R. C. Agavard and C. S. Burrus, "Number theoretic transforms to implement fast digital convolution," *Proc. IEEE*, vol. 63, no. 4, pp. 550-560, Apr. 1975.
- (2) T. S. Reed & T. K. Truoay, "The use of finite field to compute convolution," *IEEE Trans. Info. Theory*, vol. IT-21, pp.208-213, March 1975
- (3) E. Vegh and L. M. Leibowitz, "Fast complex convolution in finite rings," *IEEE Trans ASSP*, vol. 24, no. 4, pp. 343-344, Aug. 1976.
- (4) J. H. McClellan and C. M. Rader, *Number Theory in Digital Signal Processing*, Prentice-Hall, New Jersey, 1979.
- (5) 華羅庚, "數論導引," 凡異出版社, 1997。
- (6) S. -C. Pei and K. -W. Chang, "Two Dimensional Efficient Multiplier-Less Structures of Möbius Function for Ramanujan Filter Banks," in *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 68, pp. 5079-5091, 2020, doi: 10.1109/TSP.2020.3021245.
- (7) [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Combinatorics_and_Discrete_Mathematics/Elementary_Number_Theory_\(Barrus_and_Clark\)/01%3A_Chapters](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Combinatorics_and_Discrete_Mathematics/Elementary_Number_Theory_(Barrus_and_Clark)/01%3A_Chapters)
1.8 、 1.9 、 1.10 、 1.13 、 1.14 、 1.23 、 1.24 、 1.26